

Informacja dla pacjenta o ewentualnych skutkach ubocznych badania

Dotychczasowe doniesienia w publikacjach naukowych dotyczących przyjmowania wody siarkowo-siarkowodorowej w ilości nie przekraczającej 300 ml /dobę w trzech dawkach po 100 ml wskazują na brak działań niepożądanych.

Zaleca się unikanie stosowania szokowo maksymalnych dawek, terapia powinna przebiegać wg zaleceń lekarza, najczęściej przy stopniowym zwiększaniu dawek. Zalecany okres terapii nie powinien przekraczać 30 dni. Rozpoczęcie kolejnej terapii należy skonsultować z lekarzem.

Przekroczenie maksymalnej zalecanej dawki najczęściej objawia się biegunką i dyskomfortem układu trawiennego. Każdorazowo ilość przyjmowanej dawki należy konsultować z lekarzem i nie przekraczać dawki zalecanej przez zespół badawczy.

W przypadku jakichkolwiek objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem, lub innym członkiem zespołu badawczego.

Związki siarkowodoru są naturalnie wytwarzanym gazem przez organizm człowieka, przyjmowanie w zaleconych dawkach sprzyja regulacji procesów trawiennych i nie powinno wywoływać efektów ubocznych.